

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 6 - 9 - 8 3 2 2 6 6 0 1

Publication périodique de la Circonscription PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE

- MINISTERE DE L'AGRICULTURE -

- SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX -

STATION D'AVERTISSEMENTS : Ancienne Conserverie de CASAMOZZA, LUCCIANA 20290 - BORGO

Abonnement annuel : 65 Fr. à Régisseur recettes D.D.A. VAUCLUSE - MARSEILLE 9660 74 V

Edition Speciale Corse

BULLETIN N° 16

DU 19 AOUT 1983



V I G N E

=====

. Tordeuses de la grappe

Le vol de 3eme génération reste faible dans la majorité des secteurs. Par contre, dans le CAP, le vol de *Cochylis* s'intensifie. Les pontes déposées sont très variables suivant les parcelles, mais sont actuellement nombreuses dans les régions de PIANICCIA, AGHIONE, ALERIA. En situations sensibles au *Botrytis* il est prudent d'intervenir avec un produit préventif dès maintenant.

L'efficacité du traitement préventif sera contrôlé 10 à 15 jours après son exécution et le traitement curatif sera réalisé si on observe en moyenne 10 % de grains perforés.

. Pourriture grise

Des développements de pourriture grise sont localement observés dans le CAP et sur la COTE ORIENTALE. Dans les vignobles traditionnels, elle est pratiquement inexistante. Les conditions climatiques sont actuellement favorables à cette maladie et, en zones sensibles, un traitement anti-*Botrytis* est à réaliser 3 à 4 semaines avant les vendanges, soit à partir du 22 Août.

. Mildiou

Les pluies de ces derniers jours ont lessivé le dernier traitement. Renouveler le traitement avec un produit à base de cuivre. Des taches de Mildiou d'automne sont en effet visibles dans toutes les zones.

. Oïdium

La plupart des cépages ayant dépassé le stade véraison, cette maladie n'est plus à craindre.

ARBRES FRUITIERS

=====

. Cicadelles sur KIWI

En CASINCA, une population élevée de Cicadelles est actuellement observée. Intervenir avec les Matières Actives suivantes : Azinphos (nombreuses spécialités), Méthomyl (Lannate), Formothion (Anthio fort), Méthidathion (Ultracide), Oxydéméton-méthyl (Métasystémox, Anthonox), Parathion (nombreuses spécialités), Phosalone (Azofène, Zolone), Vamidothion (Kilvan, Sépaphid) ou un produit de la famille des pyréthrinoides.

CULTURES LEGUMIERES

=====

. Noctuelles maraichères (Scotia ipsilon) (Scotia ségétum)

En MARANA-CASINCA où des piègeages furent installés, les vols des papillons sont nuls. Une intervention chimique est inutile.

. Piérade du chou

Quelques dégâts de larves sont observés en MARANA et CASINCA sur des plants déjà repiqués.

Des pulvérisations à base d'Acéphate (Orthène 50)

Bromophos

Malathion

Méthomyl (Lannate)

ou Bacillus thuringiensis

Cyperméthrine

Deltaméthrine

sont conseillées pour une protection efficace des jeunes plants.

. Noctuelles défoliatrices (Mamestra brassicae) (Autographa gamma)

En cas de pullulation soudaine de ces noctuelles sur les cultures d'automne, il est possible d'intervenir soit :

en pulvérisation avec

Acéphate (Orthène 50)

Bromophos

Trichlorfon

Cyperméthrine

Deltaméthrine

soit en poudrage avec

Lindane

DEGATS DE GRELE

Dans tous les secteurs touchés par la grêle du 17 Août, il est prudent d'intervenir très rapidement avec des produits à base de Captane, Folpel, Captafol, Dichlofluamide.

